



Half- of hoogstamboomgaard

Boomgaarden zijn niet alleen landschappelijk waardevol, maar hebben vaak ook ecologische waarde voor in holten broedende vogels zoals de steenuil. Onder de schors van oude bomen leven insecten die jaarrond voedsel bieden aan vogels zoals boomkruiper en grote bonte specht. In het voorjaar trekt de bloesem insecten aan zoals hommels, bijen en zweefvliegen.

Een belangrijk onderdeel van de boomgaard is de onderbegroeiing. Een kruidenrijke vegetatie zorgt voor insecten waar diverse vogels op afkomen. Bij beweiding ontstaat een wat pollige structuur in het grasland waar muizen zich thuis voelen: een smakelijk onderdeel op het steenuilenmenu.

Instapeisen

- De onderbegroeiing bestaat uit een grazige en kruidenrijke vegetatie en wordt niet als gazon beheerd.
- De stam van de bomen mag niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen in een boomgaard met vee zijn voorzien van een boomkorf.
- Eventuele rasters zijn niet aan de bomen bevestigd.
- De boomgaard bestaat uit ten minste 10 bomen met een minimale dichtheid van 50 bomen per hectare en een maximale dichtheid van 150 bomen per hectare.

Beheervoorschriften

- Appel- en perenbomen minimaal eens per 2 jaar snoeien. Voor andere soorten alleen vorm- of onderhoudssnoei toepassen indien nodig.
- Snoeien alleen tussen 16 juli en 14 maart.
- Snoeiafval verwijderen of in rillen leggen; bij versnipperen snippers afvoeren.
- De boomgaard jaarlijks laten beweiden of de onderbegroeiing jaarlijks maaien, waarbij het maaisel wordt afgevoerd en beschadiging van de bomen (en wortels) wordt voorkomen.
- Chemische onkruidbestrijding alleen pleksgewijs bij haarden van probleemkruiden, zoals akkerdistel, ridderzuring, krulzuring, jacobskruiskruid. Glyfosaat is niet toegestaan.
- Niet branden in of nabij (< 50 meter) boomgaard.
- Niet bemesten met drijfmest. Bemesting met ruige mest (geen pluimveemest) en/of kalk mag, mits de boomwortels en bomen niet beschadigd worden.





Advies

- Als er (nog) geen nestholtes aanwezig zijn in uw boomgaard, dan liefst een steenuilenkast ophangen.
- Bij voorkeur een soortenrijke boomgaard creëren met liefst streekeigen appel, peer, kers en pruim.

BBM 126 Half- of hoogstamboomgaard



DOEL: landschappelijke waarde, hollenbroeders, bloesem voor insecten

INSTAPEISEN



minimaal **10 bomen**,
50-150 bomen per hectare



BEHEERVOORSCHRIFTEN

appel- en perenbomen minimaal eens per 2 jaar **snoeien**, andere soorten alleen indien nodig, 16 juli - 14 maart



BEHEERVOORSCHRIFTEN

snoeiafval verwijderen of in rillen leggen (snippers afvoeren)



jaarlijks **beweiden of maaien en afvoeren**, voorkom beschadiging boom(wortels)



chemische onkruidbestrijding alleen pleksgewijs (geen glyfosaat)



niet branden in of nabij (< 50 meter) haag



geen drijfmest, wel ruige mest (geen pluimveemest) en/of kalk



Weging	Corresponderend ANLb-pakket
2,5	26

biodiversiteitsmonitor.nl/BBMpakketten



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Deze factsheet is gemaakt in het kader van het project 'Zuivel versterkt Natuur en Landschap'

Versie april 2024 - wijzigingen voorbehouden. [Zie ook de Formele beschrijving BBM-pakketten.](#)